



WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2020 ROKU



Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Warszawa 2021



Spis treści

| | |
|---|----|
| Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz) | 2 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy wielkiej białej polskiej (wbp) | 6 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy duroc | 10 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy pietrain | 14 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy hampshire | 18 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy puławskiej | 22 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy wielkiej białej ojcowskiej (wbo) | 26 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras duroc i hampshire | 28 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras pietrain i hampshire | 29 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras pietrain i duroc | 30 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras wbp i pbz | 31 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras puławska i wbp | 32 |
| Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras puławska i pbz | 33 |

Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy polskiej białej zwistouchiej




Świnia duża, długa, średnio szeroka i głęboka, z dobrze umięśnioną szynką.


Szczegóły pokroju:

- głowa – nieduża, z szerokim czołem, o profilu lekko załamany, ryj średnio długi, uszy od dużych i szerokich, bezwładnie zwisających i sięgających do tarczki ryjowej do niedużych, dość wąskich, półsztywnych, nie zasłaniających oczu,
- szyja – długa, cienka i lekka,
- łopatki – małe, dobrze przylegające,
- klatka piersiowa – raczej płytka, szeroka, dobrze wysklepiona,
- grzbiet – długi, szeroki, lekko łukowaty,
- zad – długi, nieco spadzisty,
- szynki – szerokie, nisko opuszczone, bez fałd tłuszczowych,
- brzuch – głęboki, co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- nogi – kościste, stosunkowo krótkie, prosto postawione,
- skóra – bez poprzecznego fałdowania, biała, dopuszczalne niewielkie ciemne plamy pokryte białym włosem,
- szczecina – biała.

Wykres 1. Liczba loch rasy pbz objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2020





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy pbz w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|---------|
| Średnia liczba loch pod oceną | 2 687,8 |
| Liczba ocenionych miotów | 5 242 |
| Liczba prosiąt żywo urodzonych | 12,65 |
| Liczba prosiąt w 21. dniu | 11,7 |
| Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 359 |
| Okres międzymiotu (dni) | 173 |
| Liczba sutfów | 15,25 |

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy pbz ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Knury | Loszki |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Liczba ocenionych świń | 1 314 | 5 870 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 761 | 674 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 8,8 | 10,1 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 61 | 58 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 61,0 | 59,4 |
| BLUP ZWH | 10,33 | 10,25 |


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.



Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy wielkiej białej polskiej




Świnia duża, długa, średnio szeroka i głęboka, o płaskich bokach, w zadzie szeroka, z dobrze umięśnionymi szynkami.


Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości, o szerokim czole, bez poprzecznych fałd skórnych w profilu lekko załamana, policzki mięsiste, lecz płaskie, ryj prosty, uszy dość duże, szeroko ustawione, stojące, lekko pochylone do przodu i na boki,
- szyja – lekka bez przetłuszczonego karku i bez uwydatnionego podgardla,
- łopatki – płaskie, nieduże, przylegające do tułowia nie wykazujące rozluźnień w kłębie,
- klatka piersiowa – dość głęboka, silnie wysklepiona, z boków płaska bez zagłębień za łopatkami,
- grzbiet – długi, mocny lekko łukowaty,
- zad – długi, łagodnie spadzisty, ogon wysoko osadzony,
- szynki – szerokie, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych,
- brzuch – o poziomej linii podbrzusza, co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe są niedopuszczalne,
- nogi – kościste, szeroko rozstawione i proste,
- skóra – cienka, bez poprzecznego fałdowania, biała,
- szczerbina – biała.

Wykres 1. Liczba loch rasy wbp objętych oceną użyteczności rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2020





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy wbp w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|---------|
| Średnia liczba loch pod oceną | 1 698,9 |
| Liczba ocenionych miotów | 3 370 |
| Liczba prosiąt żywo urodzonych | 12,47 |
| Liczba prosiąt w 21. dniu | 11,64 |
| Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 365 |
| Okres międzymiotu (dni) | 167 |
| Liczba sutków | 14,93 |

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy wbp ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Knury | Loszki |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Liczba ocenionych świń | 526 | 3 272 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 763 | 659 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 8,7 | 10,2 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 61 | 59 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 61,4 | 59,4 |
| BLUP ZWH | 10,45 | 10,34 |


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.




Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.





Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy duroc




Świnia o średnich do dużych wymiarach ciała, śródtułowiu dość krótkie, nogi mocne, charakteryzuje się mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz rozbudowaną partią zadu z wydatnymi szynkami.


Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości, dość krótka, o profilu wklęsłym, uszy średniej wielkości, przy czym 2/3 do 3/4 ucha jest zawieszona-załamane i opadają ku przodowi,
- tułów – mocny, średnio długi, o szerokim lekko „karpioватым” grzbiecie,
- brzuch – co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- klatka piersiowa – dobrze wysklepiona,
- nogi – raczej wysokie, proste, dobrze ustawione, szeroko rozstawione o nieco stromych pęcinach,
- umaszczenie – brązowe o różnych odcieniach: od jasnozłotego do ciemnoczerwonego (mahoniowego).

Wykres 1. Liczba loch rasy duroc objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2020





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użyteczności rozplodowej loch rasy duroc w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|---------|
| Średnia liczba loch pod oceną | 290,4 |
| Liczba ocenionych miotów | 560 |
| Liczba prosiąt żywo urodzonych | 11,88 |
| Liczba prosiąt w 21. dniu | 10,82 |
| Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 371 |
| Okres międzymiotu (dni) | 180 |
| Liczba sutków | 13,54 |

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy duroc ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Knury | Loszki |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Liczba ocenionych świń | 207 | 406 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 798 | 677 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 8,6 | 10,1 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 62 | 61 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 61,8 | 60,7 |
| BLUP ZWH | 10,06 | 10,21 |


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.





Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy pietrain




Świnia średniej wielkości.


Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości, z prostym lub lekko załamany ryjem, uszy krótkie, dość szerokie, zdecydowanie stojące, rzadziej lekko pochylone ku przodowi,
- szyja – krótka, mocno umięśniona, bez przetłuszczenia i bez wyraźnego podgardla,
- klatka piersiowa – pojemna o mocno wysklepionych żebrach,
- łopatka – silnie umięśniona, dająca dobrze uformowaną szynkę przednią,
- grzbiet – długi, szeroki, mocny, równy,
- szynka – szeroka, głęboka, sięgająca do stawu skokowego, mocno wypełniona, przy czym nie przetłuszczona,
- zad – bardzo długi, łagodnie spadzisty, w lędźwiach i pośladkach szeroki, ogon wysoko osadzony,
- brzuch – co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- skóra – cienka, elastyczna, w kolorze od różowego do ciemnoszarego,
- szczecina – cienka, krótka,
- umaszczenie – łaciate, przy czym rozmieszczenie łat ciemnych i białych nieregularne często na białych łatach występuje owłosienie rude.

Wykres 1. Liczba loch rasy pietrain objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2020





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy pietrain w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|---------|
| Średnia liczba loch pod oceną | 266,5 |
| Liczba ocenionych miotów | 528 |
| Liczba prosiąt żywo urodzonych | 11,57 |
| Liczba prosiąt w 21. dniu | 10,89 |
| Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 383 |
| Okres międzymiotu (dni) | 180 |
| Liczba sutfów | 14,12 |

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy pietrain ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Knury | Loszki |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Liczba ocenionych świń | 196 | 291 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 682 | 648 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 7,5 | 8,1 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 66 | 65 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 64,1 | 63,6 |
| BLUP ZWH | 10,20 | 10,17 |


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.





Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy hampshire




Świnia charakteryzuje się średnią wielkością, mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz rozbudowaną partią zadu z wydatnymi szynkami.


Szczegóły pokroju:

- głowa – lekka, dość krótka, uszy małe wyprostowane, ryj długi lekko wklęsły,
- tułów – średniej długości, szeroki, lekko „karpowaty” grzbiet,
- brzuch – co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- nogi – wysokie, proste, kości palców ustawione pionowo (pionowo ustawione raciczki),
- umaszczenie – czarne z charakterystycznym białym pasem o różnej szerokości, przechodzącym przez łopatki, przednie kończyny i brzuch.

Wykres 1. Liczba loch rasy hampshire objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2020





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użyteczności rozplodowej loch rasy hampshire w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|---------|
| Średnia liczba loch pod oceną | 12,6 |
| Liczba ocenionych miotów | 26 |
| Liczba prosiąt żywo urodzonych | 12,42 |
| Liczba prosiąt w 21. dniu | 11,04 |
| Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 445 |
| Okres międzymiotu (dni) | 182 |
| Liczba sutfów | 13,23 |

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy hampshire ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Knury | Loszki |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Liczba ocenionych świń | 15 | 0 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 838 | - |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 8,0 | - |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 66 | - |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 63,4 | - |
| BLUP ZWH | 10,06 | - |


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.




Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.



Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy puławskiej




Świnia średniej wielkości, szeroka i głęboka, dość długa i nisko osadzona.


Szczegóły pokroju:

- głowa – nieduża, szeroka w partii czołowej, o profilu lekko załamany, ryj prosty, niezbyt długi, policzki umięśnione; uszy stojące, lekko pochylone do przodu, dopuszcza się uszy lekko zwisające
- szyja – dość krótka, w karku szeroka, bez uwydatnionego podgardla,
- łopatki – dobrze przylegające, kłęb szeroki i dobrze związany,
- klatka piersiowa – szeroka i głęboka, z silnie wysklepionym ożebrowaniem (beczkowata),
- grzbiet – szeroki, średnio długi, mocny, o linii łukowatej; lędźwie krótkie lecz szerokie,
- zad – dość długi, szeroki i mocny, dobrze związany z lędźwiami, lekko spadzisty, ogon wysoko osadzony,
- szynki – szerokie, wypukłone ku tyłowi, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych,
- brzuch – z wypełnionymi słabiznami, co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- nogi – średniej długości, o kości względnie cienkiej, lecz mocnej, postawione szeroko i prawidłowo,
- skóra – średnio gruba, bez fałdów, o barwie od łupkowo szarej do pomarańczowej,
- szczecina – przybiera barwę pigmentu skóry,
- umaszczenie – łaciate czarno-białe z przewagą barwy czarnej, dopuszcza się umaszczenie trójbarwne czarno-biało-rude oraz umaszczenie czarne z białymi plamami w dolnej części ryja, kończyn i ogona.

Wykres 1. Liczba loch rasy puławskiej objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2020





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użyteczności rozplodowej loch rasy puławskiej w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|---------|
| Średnia liczba loch pod oceną | 1 968,5 |
| Liczba ocenionych miotów | 3 432 |
| Liczba prosiąt żywo urodzonych | 10,33 |
| Liczba prosiąt w 21. dniu | 9,16 |
| Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 378 |
| Okres międzymiotu (dni) | 201 |
| Liczba sutfów | 14,42 |

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy puławskiej ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Knury | Loszki |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Liczba ocenionych świń | 660 | 3 081 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 575 | 565 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 12,6 | 12,7 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 54 | 53 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 56,5 | 56,1 |
| BLUP ZWH | 10,22 | 10,15 |


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.





Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy wielkiej białej ojcowskiej

Rasa wbo jest w fazie procesu tworzenia.

Rasa wbo wykazuje fenotypowe podobieństwo do rasy wbp. Jest to świnia duża, długa, średnio szeroka i głęboka, o płaskich bokach, w zadzie szeroka, z dobrze umięśnionymi szynkami.

Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości, o szerokim czole, bez poprzecznych fałd skórnych w profilu lekko załamana, policzki mięsiste, lecz płaskie, ryj prosty, uszy dość duże, szeroko ustawione, stojące, lekko pochylone do przodu i na boki
- szyja – lekka bez przetłuszczonego karku i bez uwydatnionego podgardla
- łopatki – płaskie, nieduże, przylegające do tułowia nie wykazujące rozluźnień w kłębie
- klatka piersiowa – dość głęboka, silnie wysklepiona, z boków płaska bez zagłębień za łopatkami
- grzbiet – długi, mocny lekko łukowaty
- zad – długi, łagodnie spadzisty, ogon wysoko osadzony
- szynki – szerokie, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych
- brzuch – o poziomej linii podbrzusza, co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe są niedopuszczalne
- nogi – kościste, szeroko rozstawione i proste
- skóra – cienka, bez poprzecznego fałdowania, biała
- szczecina – biała.

Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy wbo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.


| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|---------|
| Średnia liczba loch pod oceną | 1,5 |
| Liczba ocenionych miotów | 2 |
| Liczba prosiąt żywo urodzonych | 11,50 |
| Liczba prosiąt w 21. dniu | 11,00 |
| Wiek pierwszego oproszenia (dni) | 478 |
| Okres międzymiotu (dni) | 0 |
| Liczba sutków | 14,00 |

Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy wbo ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Knury | Loszki |
|--------------------------------------|-------|--------|
| Liczba ocenionych świń | 0 | 0 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | - | - |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | - | - |
| Wysokość „oka” polędwicy stand. (mm) | - | - |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | - | - |
| BLUP ZWH | - | - |



Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras duroc i hampshire



Knury mieszańce ras duroc i hampshire to świnię o średniej wielkości, śródtułowie krótkie, nogi mocne, charakteryzuje się mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz rozbudowaną partią zadu, z długimi sięgającymi stawu skokowego szynkami.

Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości o wklęsłym profilu i lekko załamany ryju, uszy krótkie, dość szerokie, pochylone ku przodowi
- szyja – krótka, mocno umięśniona, bez przetłuszczenia i bez wyraźnego podgardla
- klatka piersiowa – pojemna, dobrze wysklepiona
- łopatka – silnie umięśniona, dobrze związana z tułowiem
- grzbiet – długi, szeroki, mocny, lekko karpiowaty
- szynka – szeroka, głęboka, sięgająca do stawu skokowego
- zad – długi, łagodnie spadzisty, średnio szeroki
- nogi – raczej wysokie, proste, dobrze spionowane, szeroko rozstawione o nieco stromych pęcicach
- szczecina – gruba, średnio długa
- umaszczenie – jednolite cielisto-rude przez mahoniowe do czarnego z występującym białym pasem obejmującym kark, łopatki oraz kończyny przednie.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów mieszańców ras duroc i hampshire ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba ocenionych świń | 4 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 895 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 8,0 |
| Wysokość „oka” polędwicy stand. (mm) | 67 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 63,0 |



Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras pietrain i hampshire



Knury mieszańce pietrain i hampshire, to świnię o średniej wielkości, śródtułowiu dość krótkie, nogi mocne, charakteryzuje się mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz rozbudowaną partią zadu z wydatnymi szynkami, linia grzbietu lekko karpiowata.

Szczegóły pokroju:

- głowa – lekka, średniej wielkości, z lekko załamany ryjem
- uszy – krótkie, dość szerokie, lekko pochylone ku przodowi
- klatka piersiowa – pojemna, dobrze wysklepiona i prawidłowo ożebrowana, łopatka dobrze umięśniona, silnie związana z tułowiem
- grzbiet – długi, szeroki, mocny, lekko karpiowaty
- szynka – szeroka, głęboka, sięgająca do stawu skokowego, mocno wypełniona, przy czym nieprzetłuszczona
- zad – łagodnie spadzisty, szeroki
- nogi – średnio wysokie, proste, dobrze ustawione, szeroko rozstawione
- szczecina – cienka, krótka
- umaszczenie – jednolite czarne z białym pasem obejmującym łopatki i kończyny przednie, głowa czarna, ryj i jego tarcza najczęściej białe

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów mieszańców ras hampshire i pietrain ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba ocenionych świń | 17 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 840 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 7,7 |
| Wysokość „oka” polędwicy stand. (mm) | 68 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 64,7 |



Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras pietrain i duroc



Knury mieszańce ras pietrain i duroc, to świny o średniej wielkości, śródtułowiu dość krótkie, nogi mocne. Charakteryzują się mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz silnie umięśnioną łopatką i mocno rozbudowaną partią zadu z wydatnymi szynkami.

Szczegóły pokroju:

- głowa – lekka, średniej wielkości, z prostym lub lekko załamany ryjem
- uszy – krótkie, dość szerokie, pochylone ku przodowi
- szyja – krótka, mocno umięśniona, bez przetłuszczenia i bez wyraźnego podgardla
- klatka piersiowa – pojemna, dobrze wysklepiona i prawidłowo ożebrowana
- łopatka – silnie umięśniona, dobrze związana z tułowiem
- grzbiet – długi, szeroki, mocny, równy lub lekko karpiowaty
- szynka – szeroka, głęboka, sięgająca do stawu skokowego, mocno wypełniona, przy czym nieprzetłuszczona
- zad – bardzo długi, łagodnie spadzisty, w lędźwiach i pośladkach szeroki
- nogi – średnio wysokie, proste, dobrze ustawione, szeroko rozstawione o nieco stromych pęcicach
- szczecina – cienka, krótka
- umaszczenie – jednolite cielisto-rude do mahoniowego z występującymi nieregularnie czarnymi łatami z ciemnym lub jasnym włosem.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów mieszańców ras pietrain i duroc ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba ocenionych świń | 1 295 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 749 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 8,0 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 63 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 63,2 |



Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras wbp i pbz



Loszka mieszańców ras wbp i pbz to świnia duża, długa, średnio szeroka i głęboka, w zadzie szeroka, z dobrze umięśnionymi szynkami.

Szczegóły pokroju:

- głowa – lekka, średniej wielkości, o szerokim czole
- uszy – średniej wielkości, od zwisłych po stojące, lekko pochylone do przodu i na boki, szeroko ustawione
- szyja – długa i lekka
- łopatki – płaskie, nieduże, dobrze związane z tułowiem
- klatka piersiowa – średniej głębokości, dobrze wysklepiona i prawidłowo ożebrowana, bez zagłębień za łopatkami
- grzbiet – długi, mocny, równy, lekko łukowaty
- zad – długi, lekko spadzisty
- szynki – szerokie, nisko opuszczone, bez fałd tłuszczowych
- brzuch – o poziomej linii podbrzusza, listwa mleczna długa z co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętymi sutkami; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe są niedopuszczalne
- nogi – mocne, kościste, średnio długie, szeroko rozstawione i proste
- skóra – cienka, bez poprzecznego fałdowania, biała
- szczerbina – biała; dopuszcza się występowanie pigmentowanych plam pod warunkiem, że wyrasta z nich szczerbina koloru białego.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek mieszańców ras wbp i pbz ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba ocenionych świń | 3 242 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 681 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 10,0 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 58 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 59,3 |

Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras puławska i wbp



Loszka mieszańców puławska i wbp to świnia średniej wielkości do dużej, szeroka i głęboka, dość długa i wysoko osadzona na dobrze spionowanych kończynach.

Szczegóły pokroju:

- głowa – nieduża, szeroka w partii czołowej, o profilu lekko wklęsłym, ryj prosty, niezbyt długi, policzki umięśnione; uszy stojące, lekko pochylone do przodu, dopuszcza się uszy lekko zwisające
- szyja – dość krótka, w karku szeroka, bez uwydatnionego podgardla
- łopatki – dobrze przylegające, kłąb szeroki i dobrze związany
- klatka piersiowa – szeroka i głęboka, z silnie wysklepionym ozebrowaniem (beczkowata)
- grzbiet – szeroki, średnio długi, mocny, o linii łukowatej; lędźwie długie, szerokie
- zad – dość długi, szeroki i mocny, dobrze związany z lędźwiami, lekko spadzisty, ogon wysoko osadzony, wyraźnie zaznaczone zewnętrzne narządy płciowe
- szynki – szerokie, dobrze uwypuklone ku tyłowi, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych, średniej długości
- brzuch – prosty, listwa mleczna z co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętymi sutkami; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne
- nogi – dość długie, o kości względnie cienkiej, lecz mocnej, postawione szeroko i prawidłowo
- skóra – średnio gruba, bez fałdów, o barwie cielisto różowej
- szczecina – biała
- umaszczenie – białe jednolite.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek mieszańców ras puławska i wbp ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba ocenionych świń | 185 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 604 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 12,3 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 53 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 56,2 |

Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras puławska i pbz



Loszka mieszańców świń ras puławska i pbz to świnia średniej wielkości, szeroka i głęboka, długa, nisko osadzona na dobrze spionowanych kończynach.

Szczegóły pokroju:

- głowa – nieduża, szeroka w partii czołowej, o profilu lekko wklęsłym, ryj prosty, niezbyt długi, policzki umięśnione; uszy pochylone do przodu, zwisające, czasem opadające na oczy
- szyja – dość długa, w karku szeroka, z uwydatnieniem podgardlem
- łopatki – dobrze przylegające, kłęb szeroki i dobrze związany
- klatka piersiowa – szeroka i głęboka, z wysklepionym ożebrowaniem (lekko beczkowata)
- grzbiet – szeroki, średnio długi, mocny, o linii prostej lędźwie długie, szerokie
- zad – dość długi, szeroki i mocny, dobrze związany z lędźwiami, lekko spadzisty, ogon wysoko osadzony, wyraźnie zaznaczone zewnętrzne narządy płciowe
- szynki – szerokie, uwypuklone ku tyłowi, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych, średniej długości
- brzuch – prosty, listwa mleczna z co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętymi sutkami; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne
- nogi – raczej krótkie, o względnie cienkiej, lecz mocnej kości, postawione szeroko i prawidłowo
- skóra – średnio gruba, bez fałdów, o barwie cielisto różowej
- szczecina – biała
- umaszczenie – umaszczenie białe; dopuszczalne są świnie z pojedynczymi łatami, włos na łatach winien być biały.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek mieszańców ras puławska i pbz ocenionych przyzyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---------|
| Liczba ocenionych świń | 99 |
| Przyrost dzienny stand. (g) | 595 |
| Średnia grubość słoniny stand. (mm) | 12,5 |
| Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm) | 53 |
| Zawartość mięsa w tuszy stand. (%) | 56,3 |



www.polsus.pl