



WYNIKI OCENY TRZODY CHLEWNEJ W 2021 ROKU



Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Warszawa 2022



Spis treści

Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy polskiej białej zwisłouchej (pbz)	2
Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy wielkiej białej polskiej (wbp)	6
Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy duroc	10
Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy pietrain	14
Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy hampshire	18
Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy puławskiej	22
Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy wielkiej białej ojcowskiej (wbo)	26
Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras duroc i hampshire	28
Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras pietrain i hampshire	29
Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras pietrain i duroc	30
Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras wbp i pbz	31
Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras puławska i wbp	32
Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras puławska i pbz	33

Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy polskiej białej zwistouchej




Świnia duża, długa, średnio szeroka i głęboka, z dobrze umięśnioną szynką.


Szczegóły pokroju:

- głowa – nieduża, z szerokim czołem, o profilu lekko załamany, ryj średnio długi, uszy od dużych i szerokich, bezwładnie zwisających i sięgających do tarczki ryjowej do niedużych, dość wąskich, półsztywnych, nie zasłaniających oczu,
- szyja – długa, cienka i lekka,
- łopatki – małe, dobrze przylegające,
- klatka piersiowa – raczej płytka, szeroka, dobrze wysklepiona,
- grzbiet – długi, szeroki, lekko łukowaty,
- zad – długi, nieco spadzisty,
- szynki – szerokie, nisko opuszczone, bez fałd tłuszczowych,
- brzuch – głęboki, co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- nogi – kościste, stosunkowo krótkie, prosto postawione,
- skóra – bez poprzecznego fałdowania, biała, dopuszczalne niewielkie ciemne plamy pokryte białym włosem,
- szczecina – biała.

Wykres 1. Liczba loch rasy pbz objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2021





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy pbz w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Średnia liczba loch pod oceną	1 447,6
Liczba ocenionych miotów	2 889
Liczba prosiąt żywo urodzonych	12,77
Liczba prosiąt w 21. dniu	11,84
Wiek pierwszego oproszenia (dni)	360
Okres międzymiotu (dni)	172
Liczba sutków	15,22

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy pbz ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Knury	Loszki
Liczba ocenionych świń	1 134	5 978
Przyrost dzienny stand. (g)	738	657
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	9,1	10,2
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	59	57
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	61,1	59,7
BLUP ZWH	10,24	10,24


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.



Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy wielkiej białej polskiej




Świnia duża, długa, średnio szeroka i głęboka, o płaskich bokach, w zadzie szeroka, z dobrze umięśnionymi szynkami.


Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości, o szerokim czole, bez poprzecznych fałd skórnych w profilu lekko załamana, policzki mięsiste, lecz płaskie, ryj prosty, uszy dość duże, szeroko ustawione, stojące, lekko pochylone do przodu i na boki,
- szyja – lekka bez przetłuszczonego karku i bez uwydatnionego podgardla,
- łopatki – płaskie, nieduże, przylegające do tułowia nie wykazujące rozluźnień w kłębie,
- klatka piersiowa – dość głęboka, silnie wysklepiona, z boków płaska bez zagłębień za łopatkami,
- grzbiet – długi, mocny lekko łukowaty,
- zad – długi, łagodnie spadzisty, ogon wysoko osadzony,
- szynki – szerokie, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych,
- brzuch – o poziomej linii podbrzusza, co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe są niedopuszczalne,
- nogi – kościste, szeroko rozstawione i proste,
- skóra – cienka, bez poprzecznego fałdowania, biała,
- szczerbina – biała.

Wykres 1. Liczba loch rasy wbp objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2021





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy wbp w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Średnia liczba loch pod oceną	849,2
Liczba ocenionych miotów	1 727
Liczba prosiąt żywo urodzonych	12,72
Liczba prosiąt w 21. dniu	11,88
Wiek pierwszego oproszenia (dni)	368
Okres międzymiotu (dni)	167
Liczba sutków	15,02

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy wbp ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Knury	Loszki
Liczba ocenionych świń	388	2 929
Przyrost dzienny stand. (g)	755	649
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	9,0	10,1
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	60	58
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	61,5	59,8
BLUP ZWH	10,37	10,48


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.




Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.



Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy duroc




Świnia o średnich do dużych wymiarach ciała, śródtułowiu dość krótkie, nogi mocne, charakteryzuje się mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz rozbudowaną partią zadu z wydatnymi szynkami.


Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości, dość krótka, o profilu wklęsłym, uszy średniej wielkości, przy czym 2/3 do 3/4 ucha jest zawieszona-załamane i opadają ku przodowi,
- tułów – mocny, średnio długi, o szerokim lekko „karpioватым” grzbiecie,
- brzuch – co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- klatka piersiowa – dobrze wysklepiona,
- nogi – raczej wysokie, proste, dobrze ustawione, szeroko rozstawione o nieco stromych pęcinach,
- umaszczenie – brązowe o różnych odcieniach: od jasnozłotego do ciemnoczerwonego (mahoniowego).

Wykres 1. Liczba loch rasy duroc objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2021





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy duroc w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Średnia liczba loch pod oceną	138,2
Liczba ocenionych miotów	276
Liczba prosiąt żywo urodzonych	11,86
Liczba prosiąt w 21. dniu	10,97
Wiek pierwszego oproszenia (dni)	369
Okres międzymiotu (dni)	174
Liczba sutfów	13,38

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy duroc ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Knury	Loszki
Liczba ocenionych świń	162	399
Przyrost dzienny stand. (g)	790	679
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	8,6	10,1
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	61	61
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	62,6	61,3
BLUP ZWH	10,03	10,10


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.





Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy pietrain




Świnia średniej wielkości.


Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości, z prostym lub lekko załamany ryjem, uszy krótkie, dość szerokie, zdecydowanie stojące, rzadziej lekko pochylone ku przodowi,
- szyja – krótka, mocno umięśniona, bez przetłuszczenia i bez wyraźnego podgardla,
- klatka piersiowa – pojemna o mocno wysklepionych żebrach,
- łopatka – silnie umięśniona, dająca dobrze uformowaną szynkę przednią,
- grzbiet – długi, szeroki, mocny, równy,
- szynka – szeroka, głęboka, sięgająca do stawu skokowego, mocno wypełniona, przy czym nie przetłuszczona,
- zad – bardzo długi, łagodnie spadzisty, w lędźwiach i pośladkach szeroki, ogon wysoko osadzony,
- brzuch – co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- skóra – cienka, elastyczna, w kolorze od różowego do ciemnoszarego,
- szczecina – cienka, krótka,
- umaszczenie – łaciate, przy czym rozmieszczenie łat ciemnych i białych nieregularne często na białych łatach występuje owłosienie rude.

Wykres 1. Liczba loch rasy pietrain objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2021





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy pietrain w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Średnia liczba loch pod oceną	105,4
Liczba ocenionych miotów	212
Liczba prosiąt żywo urodzonych	11,74
Liczba prosiąt w 21. dniu	10,91
Wiek pierwszego oproszenia (dni)	382
Okres międzymiotu (dni)	175
Liczba sutków	13,88

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy pietrain ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Knury	Loszki
Liczba ocenionych świń	137	207
Przyrost dzienny stand. (g)	682	643
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	7,7	8,4
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	65	64
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	64,3	63,5
BLUP ZWH	10,11	10,24


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.





Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy hampshire




Świnia charakteryzuje się średnią wielkością, mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz rozbudowaną partią zadu z wydatnymi szynkami.


Szczegóły pokroju:

- głowa – lekka, dość krótka, uszy małe wyprostowane, ryj długi lekko wklęsły,
- tułów – średniej długości, szeroki, lekko „karpowaty” grzbiet,
- brzuch – co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- nogi – wysokie, proste, kości palców ustawione pionowo (pionowo ustawione raciczki),
- umaszczenie – czarne z charakterystycznym białym pasem o różnej szerokości, przechodzącym przez łopatki, przednie kończyny i brzuch.

Wykres 1. Liczba loch rasy hampshire objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2021





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użyteczności rozplodowej loch rasy hampshire w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Średnia liczba loch pod oceną	9,0
Liczba ocenionych miotów	16
Liczba prosiąt żywo urodzonych	12,13
Liczba prosiąt w 21. dniu	10,81
Wiek pierwszego oproszenia (dni)	-
Okres międzymiotu (dni)	194
Liczba sutfów	13,11

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy hampshire ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Knury	Loszki
Liczba ocenionych świń	12	5
Przyrost dzienny stand. (g)	815	813
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	9,2	8,5
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	64	60
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	63,6	62,2
BLUP ZWH	10,37	10,22


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.




Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.



Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy puławskiej




Świnia średniej wielkości, szeroka i głęboka, dość długa i nisko osadzona.


Szczegóły pokroju:

- głowa – nieduża, szeroka w partii czołowej, o profilu lekko załamany, ryj prosty, niezbyt długi, policzki umięśnione; uszy stojące, lekko pochylone do przodu, dopuszcza się uszy lekko zwisające
- szyja – dość krótka, w karku szeroka, bez uwydatnionego podgardla,
- łopatki – dobrze przylegające, kłęb szeroki i dobrze związany,
- klatka piersiowa – szeroka i głęboka, z silnie wysklepionym ożebrowaniem (beczkowata),
- grzbiet – szeroki, średnio długi, mocny, o linii łukowatej; lędźwie krótkie lecz szerokie,
- zad – dość długi, szeroki i mocny, dobrze związany z lędźwiami, lekko spadzisty, ogon wysoko osadzony,
- szynki – szerokie, wypukłone ku tyłowi, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych,
- brzuch – z wypełnionymi słabiznami, co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków, dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne,
- nogi – średniej długości, o kości względnie cienkiej, lecz mocnej, postawione szeroko i prawidłowo,
- skóra – średnio gruba, bez fałdów, o barwie od łupkowo szarej do pomarańczowej,
- szczecina – przybiera barwę pigmentu skóry,
- umaszczenie – łaciate czarno-białe z przewagą barwy czarnej, dopuszcza się umaszczenie trójbarwne czarno-biało-rude oraz umaszczenie czarne z białymi plamami w dolnej części ryja, kończyn i ogona.

Wykres 1. Liczba loch rasy puławskiej objętych oceną użytkowości rozplodowej



Wykres 2. Zmiany ilości i wielkości stad



Wykres 3. Liczba stad z uwzględnieniem liczby loch w stadzie, 31.12.2021





Tabela 1. Średnie wyniki oceny użyteczności rozplodowej loch rasy puławskiej w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Średnia liczba loch pod oceną	1 871,7
Liczba ocenionych miotów	3 396
Liczba prosiąt żywo urodzonych	10,12
Liczba prosiąt w 21. dniu	9,06
Wiek pierwszego oproszenia (dni)	368
Okres międzymiotu (dni)	200
Liczba sutfów	14,40

Wykres 4. Plenność i długość okresu międzymiotu



Wykres 5. Liczba prosiąt żywo urodzonych i w 21. dniu życia






Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy puławskiej ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Knury	Loszki
Liczba ocenionych świń	695	4 100
Przyrost dzienny stand. (g)	567	558
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	13,2	13,0
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	54	53
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	55,9	55,9
BLUP ZWH	10,10	10,10


Wykres 6. Przyrost dzienny stand.




Wykres 7. Średnia grubość słoniny stand.



Wykres 8. Wysokość „oka” połędwicy stand.



Wykres 9. Zawartość mięsa w tuszy stand.





Wyniki oceny wartości użytkowej świń rasy wielkiej białej ojcowskiej

Rasa wbo jest w fazie procesu tworzenia.

Rasa wbo wykazuje fenotypowe podobieństwo do rasy wbp. Jest to świnia duża, długa, średnio szeroka i głęboka, o płaskich bokach, w zadzie szeroka, z dobrze umięśnionymi szynkami.

Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości, o szerokim czole, bez poprzecznych fałd skórnych w profilu lekko załamana, policzki mięsiste, lecz płaskie, ryj prosty, uszy dość duże, szeroko ustawione, stojące, lekko pochylone do przodu i na boki
- szyja – lekka bez przetłuszczonego karku i bez uwydatnionego podgardla
- łopatki – płaskie, nieduże, przylegające do tułowia nie wykazujące rozluźnień w kłębie
- klatka piersiowa – dość głęboka, silnie wysklepiona, z boków płaska bez zagłębień za łopatkami
- grzbiet – długi, mocny lekko łukowaty
- zad – długi, łagodnie spadzisty, ogon wysoko osadzony
- szynki – szerokie, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych
- brzuch – o poziomej linii podbrzusza, co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętych sutków; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe są niedopuszczalne
- nogi – kościste, szeroko rozstawione i proste
- skóra – cienka, bez poprzecznego fałdowania, biała
- szczecina – biała.

Tabela 1. Średnie wyniki oceny użytkowości rozplodowej loch rasy wbo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.


Cecha	Wartość
Średnia liczba loch pod oceną	2,0
Liczba ocenionych miotów	4
Liczba prosiąt żywo urodzonych	14,25
Liczba prosiąt w 21. dniu	12,50
Wiek pierwszego oproszenia (dni)	-
Okres międzymiotu (dni)	222
Liczba sutków	14,00

Tabela 2. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów i loszek rasy wbo ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Knury	Loszki
Liczba ocenionych świń	6	0
Przyrost dzienny stand. (g)	854	-
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	10,3	-
Wysokość „oka” polędwicy stand. (mm)	64	-
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	63,4	-
BLUP ZWH	-	-



Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras duroc i hampshire



Knury mieszańce ras duroc i hampshire to świnię o średniej wielkości, śródtułowie krótkie, nogi mocne, charakteryzuje się mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz rozbudowaną partią zadu, z długimi sięgającymi stawu skokowego szynkami.

Szczegóły pokroju:

- głowa – średniej wielkości o wklęsłym profilu i lekko załamany ryju, uszy krótkie, dość szerokie, pochylone ku przodowi
- szyja – krótka, mocno umięśniona, bez przetłuszczenia i bez wyraźnego podgardla
- klatka piersiowa – pojemna, dobrze wysklepiona
- łopatka – silnie umięśniona, dobrze związana z tułowiem
- grzbiet – długi, szeroki, mocny, lekko karpiowaty
- szynka – szeroka, głęboka, sięgająca do stawu skokowego
- zad – długi, łagodnie spadzisty, średnio szeroki
- nogi – raczej wysokie, proste, dobrze spionowane, szeroko rozstawione o nieco stromych pęcicach
- szczecina – gruba, średnio długa
- umaszczenie – jednolite cielisto-rude przez mahoniowe do czarnego z występującym białym pasem obejmującym kark, łopatki oraz kończyny przednie.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów mieszańców ras duroc i hampshire ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.

Cecha	Wartość
Liczba ocenionych świń	2
Przyrost dzienny stand. (g)	737
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	8,3
Wysokość „oka” polędwicy stand. (mm)	61
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	62,5



Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras pietrain i hampshire



Knury mieszańce pietrain i hampshire, to świnię o średniej wielkości, śródtułowie dość krótkie, nogi mocne, charakteryzuje się mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz rozbudowaną partią zadu z wydatnymi szynkami, linia grzbietu lekko karpiowata.

Szczegóły pokroju:

- głowa – lekka, średniej wielkości, z lekko załamany ryjem
- uszy – krótkie, dość szerokie, lekko pochylone ku przodowi
- klatka piersiowa – pojemna, dobrze wysklepiona i prawidłowo ożebrowana, łopatka dobrze umięśniona, silnie związana z tułowiem
- grzbiet – długi, szeroki, mocny, lekko karpiowaty
- szynka – szeroka, głęboka, sięgająca do stawu skokowego, mocno wypełniona, przy czym nieprzetłuszczona
- zad – łagodnie spadzisty, szeroki
- nogi – średnio wysokie, proste, dobrze ustawione, szeroko rozstawione
- szczecina – cienka, krótka
- umaszczenie – jednolite czarne z białym pasem obejmującym łopatki i kończyny przednie, głowa czarna, ryj i jego tarcza najczęściej białe

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów mieszańców ras hampshire i pietrain ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Liczba ocenionych świń	30
Przyrost dzienny stand. (g)	832
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	8,2
Wysokość „oka” polędwicy stand. (mm)	64
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	63,8



Wyniki oceny wartości użytkowej knurów mieszańców ras pietrain i duroc



Knury mieszańce ras pietrain i duroc, to świny o średniej wielkości, śródtułowie dość krótkie, nogi mocne. Charakteryzują się mocną konstytucją, szerokim grzbietem oraz silnie umięśnioną łopatką i mocno rozbudowaną partią zadu z wydatnymi szynkami.

Szczegóły pokroju:

- głowa – lekka, średniej wielkości, z prostym lub lekko załamany ryjem
- uszy – krótkie, dość szerokie, pochylone ku przodowi
- szyja – krótka, mocno umięśniona, bez przetłuszczenia i bez wyraźnego podgardla
- klatka piersiowa – pojemna, dobrze wysklepiona i prawidłowo ożebrowana
- łopatka – silnie umięśniona, dobrze związana z tułowiem
- grzbiet – długi, szeroki, mocny, równy lub lekko karpiowaty
- szynka – szeroka, głęboka, sięgająca do stawu skokowego, mocno wypełniona, przy czym nieprzetłuszczona
- zad – bardzo długi, łagodnie spadzisty, w lędźwiach i pośladkach szeroki
- nogi – średnio wysokie, proste, dobrze ustawione, szeroko rozstawione o nieco stromych pęcicach
- szczecina – cienka, krótka
- umaszczenie – jednolite cielisto-rude do mahoniowego z występującymi nieregularnie czarnymi łatami z ciemnym lub jasnym włosiem.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej knurów mieszańców ras pietrain i duroc ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Liczba ocenionych świń	1 060
Przyrost dzienny stand. (g)	739
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	8,5
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	62
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	62,9

Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras wbp i pbz



Loszka mieszańców ras wbp i pbz to świnia duża, długa, średnio szeroka i głęboka, w zadzie szeroka, z dobrze umięśnionymi szynkami.

Szczegóły pokroju:

- głowa – lekka, średniej wielkości, o szerokim czole
- uszy – średniej wielkości, od zwisłych po stojące, lekko pochylone do przodu i na boki, szeroko ustawione
- szyja – długa i lekka
- łopatki – płaskie, nieduże, dobrze związane z tułowiem
- klatka piersiowa – średniej głębokości, dobrze wysklepiona i prawidłowo ożebrowana, bez zagłębień za łopatkami
- grzbiet – długi, mocny, równy, lekko łukowaty
- zad – długi, lekko spadzisty
- szynki – szerokie, nisko opuszczone, bez fałd tłuszczowych
- brzuch – o poziomej linii podbrzusza, listwa mleczna długa z co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętymi sutkami; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe są niedopuszczalne
- nogi – mocne, kościste, średnio długie, szeroko rozstawione i proste
- skóra – cienka, bez poprzecznego fałdowania, biała
- szczerbina – biała; dopuszcza się występowanie pigmentowanych plam pod warunkiem, że wyrasta z nich szczerbina koloru białego.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek mieszańców ras wbp i pbz ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Liczba ocenionych świń	3 440
Przyrost dzienny stand. (g)	662
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	10,2
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	58
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	59,4

Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras puławska i wbp



Loszka mieszańców puławska i wbp to świnia średniej wielkości do dużej, szeroka i głęboka, dość długa i wysoko osadzona na dobrze spionowanych kończynach.

Szczegóły pokroju:

- głowa – nieduża, szeroka w partii czołowej, o profilu lekko wklęsłym, ryj prosty, niezbyt długi, policzki umięśnione; uszy stojące, lekko pochylone do przodu, dopuszcza się uszy lekko zwisające
- szyja – dość krótka, w karku szeroka, bez uwydatnionego podgardla
- łopatki – dobrze przylegające, kłąb szeroki i dobrze związany
- klatka piersiowa – szeroka i głęboka, z silnie wysklepionym ozebrowaniem (beczkowata)
- grzbiet – szeroki, średnio długi, mocny, o linii łukowatej; lędźwie długie, szerokie
- zad – dość długi, szeroki i mocny, dobrze związany z lędźwiami, lekko spadzisty, ogon wysoko osadzony, wyraźnie zaznaczone zewnętrzne narządy płciowe
- szynki – szerokie, dobrze uwypuklone ku tyłowi, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych, średniej długości
- brzuch – prosty, listwa mleczna z co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętymi sutkami; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne
- nogi – dość długie, o kości względnie cienkiej, lecz mocnej, postawione szeroko i prawidłowo
- skóra – średnio gruba, bez fałdów, o barwie cielisto różowej
- szczecina – biała
- umaszczenie – białe jednolite.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek mieszańców ras puławska i wbp ocenionych przyżyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Liczba ocenionych świń	132
Przyrost dzienny stand. (g)	605
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	12,6
Wysokość „oka” polędwicy stand. (mm)	53
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	55,9

Wyniki oceny wartości użytkowej loszek mieszańców ras puławska i pbz



Loszka mieszańców świń ras puławska i pbz to świnia średniej wielkości, szeroka i głęboka, długa, nisko osadzona na dobrze spionowanych kończynach.

Szczegóły pokroju:

- głowa – nieduża, szeroka w partii czołowej, o profilu lekko wklęsłym, ryj prosty, niezbyt długi, policzki umięśnione; uszy pochylone do przodu, zwisające, czasem opadające na oczy
- szyja – dość długa, w karku szeroka, z uwydatnieniami podgardlem
- łopatki – dobrze przylegające, kłęb szeroki i dobrze związany
- klatka piersiowa – szeroka i głęboka, z wysklepionym ożebrowaniem (lekko beczkowata)
- grzbiet – szeroki, średnio długi, mocny, o linii prostej lędźwie długie, szerokie
- zad – dość długi, szeroki i mocny, dobrze związany z lędźwiami, lekko spadzisty, ogon wysoko osadzony, wyraźnie zaznaczone zewnętrzne narządy płciowe
- szynki – szerokie, uwypuklone ku tyłowi, sięgające do stawów skokowych, bez fałd tłuszczowych, średniej długości
- brzuch – prosty, listwa mleczna z co najmniej 12 prawidłowo rozwiniętymi sutkami; dopuszcza się asymetrię 1 sutka, sutki kraterowe niedopuszczalne
- nogi – raczej krótkie, o względnie cienkiej, lecz mocnej kości, postawione szeroko i prawidłowo
- skóra – średnio gruba, bez fałdów, o barwie cielisto różowej
- szczecina – biała
- umaszczenie – umaszczenie białe; dopuszczalne są świnie z pojedynczymi łatami, włos na łatach winien być biały.

Tabela 1. Średnie wyniki użytkowości tucznej i rzeźnej loszek mieszańców ras puławska i pbz ocenionych przyzyciowo w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Cecha	Wartość
Liczba ocenionych świń	105
Przyrost dzienny stand. (g)	590
Średnia grubość słoniny stand. (mm)	12,6
Wysokość „oka” połędwicy stand. (mm)	52
Zawartość mięsa w tuszy stand. (%)	56,0



www.polsus.pl